

Arteria magna ramio-  
necum, iecur,  
bilis uescula,  
uentriculum,  
lienem, duode-  
nii et coli par-  
tem accedens.

ipsum cordis<sup>h</sup> inuolucrum quā id septo adhaesit spargens. Post commemoratas propagi-  
nes magna arteria, ex elatiori sui corporis sede<sup>i</sup> unum promit truncum, ramos in uentriculum,  
iecur, bilis uesculam, lienem, omentum, & duodenum intestinum, & colon quoque ubi uen-  
triculo id exporrigitur, ad hunc modum offerentem. Praesens truncus simulatq<sup>h</sup> prodijit, ela-  
tiori sede inferioris membranae omenti suffulcitur, ac in duos magnitudine propemodum æ-  
quales ramos diremptus, hūc<sup>i</sup> qui gracilior paulo est dextrorsum, illū uerō qui modicē am-  
plior uisitur sinistrorsum mittit. Dexter ramus uenae portae in<sup>h</sup> glandoso corpore, quod sub  
uentriculi posteriori sede huic omenti membranae intertextum cernitur, adnexus, sursum ad  
iecoris cauum contendit, in medio ductu ex humiliori ipsius sede<sup>o</sup> furculum inferiori omen-  
ti membranae, ipsiq<sup>h</sup> adeo colo intestino hūc deriuans. Post hunc ab elatiori parte<sup>h</sup> sobolem  
uentriculo exporrigit, quae in posteriorem ipsius sedem qua is dorsum spectat, pauculis ramu-  
lis digeritur. Ex humiliori rursus sede, dexter arteriae ramus ad iecoris cauum tendens, duas de  
nuo profert soboles.<sup>h</sup> Vnum cum uenae portae ramo intestino diffundit, quod duodenum ap-  
pellamus, secundum cuius mediam longitudinem & aliquouſque ad ieiuni intestini initium ea  
soboles porrigitur. Altera nuper commemorata paulo amplior, ad dextram fundi uentriculi  
sedem retorquetur, & superiori omenti membranae innexa, ex elatiori sede in anteriora & po-  
steriora fundi uentriculi ramulos frequentū sobole spargit, perinde ac ab inferiori sua sede alias  
in omenti superiorem membranam ducit. Atque haec arteriae cum portae uenae ramo hāc ex  
porrecto ad medium fundi uentriculi cessat. Quod uerō dextrae arteriae rami adhuc superest,  
postquam ab eminentiori<sup>i</sup> duos insigniter exiles furculos bilis uesculae transmissit, in<sup>h</sup> ramu-  
los aliquot sectum ad iecoris cauum terminatur, non admodum altē in iecoris substantiam dif-  
feminatum. Sinister ramus ab arteriae caudice prodijit, quem<sup>h</sup> dextro modicē crassiores  
esse dicebamus, inferiori quoque omenti membranae ipsiusq<sup>h</sup> glandoso corpori committitur,  
coniungens se uenae portae ramo, in tot quot ille soboles digerendus. Mox enim praesens arte-  
riae ramus ab eminentiori sede<sup>o</sup> propaginem uentriculo qua dorso innititur offert, quae pri-  
mū<sup>h</sup> sobolem unam utrinque in mediam uentriculi sedem eius quae dorso incumbit regio-  
nis exporrigit. deinde sursum ascendens, uenae portae<sup>h</sup> modo superius uentriculi orificium co-  
ronae instar appositissime<sup>o</sup> cingit, ramulos uentriculi corpori & graciles furculos stomachi  
termino, quo is uentriculo continuatur, distribuens. Inter reliquos autem ramos<sup>h</sup> unus secu-  
dum uentriculi superiora dextrorsum exporrectus, uentriculi humilioris aditorificium, furcu-  
los quoque in progressu anteriori & posteriori sedibus uentriculi depromens. Sinister arte-  
riae ramus lienem potissimum accedens, ab humiliori ipsius sede<sup>o</sup> propaginem in inferiorem  
omenti membranam diffundit, quae paulo post exortum in duos ramos inuicem ualde didu-  
ctos discedit, numerosam arteriarum sobolem deorsum in nunc dictam omenti membra-  
nam & colon intestinum propagantes. Hac edita propagine, sinister ille arteriae ramus sini-  
strorsum magis ducitur, & uenae ipsi attentē ritu in duas diffunditur arterias: & haec rursus in  
alias tantisper dirimuntur, donec<sup>h</sup> frequentiorum serie lienis cauo secundum rectam line-  
am implantentur. Priusquam uerō omnes arteriae in lienem cessent, ab humiliore parte eius quae  
demissiore lienis sedem adit, plerunque<sup>h</sup> ramulus inferiori membranae omenti offertur.  
Deinceps ab illa arteria, quae infimae lienis arteriae proxima est, priusquam haec in lienem de-  
perditur, propago pullulat, quae superiori membrana omenti suffulta, dextrorsum ad uentri-  
culi fundum contorquetur, sinistramq<sup>h</sup> uentriculi fundi sedem perreptans, geniculatim ramu-  
los anteriori & posteriori sedibus, ac dein superiori membranae omenti soboles spargit. Item  
ab alijs lienem adeuntibus arterijs<sup>h</sup> ramuli enascuntur, qui sinistram uentriculi latus illo pror-  
sus modo adeunt, quo a uenis lienem petentibus propagines eodem pertinere, superius com-  
memoratum est. Ceterum a magnae arteriae corpore, paulo inferius quā<sup>m</sup> truncus cuius  
iam seriem absoluiimus, principium ducit, ab elatiori quoque corporis parte<sup>h</sup> alia promittit ar-  
teria, quae in superiorē mesenterij sedē in plurimas soboles diffusa, uenae portae modo excurrit  
in ieiunum, & ilium & coli intestini partē, quae a iecoris cauo ad dextrum renem usq<sup>h</sup> pertinet.  
Post hanc inferius paululum ab utroque magnae arteriae latere, ampla educitur arteria in su-  
latis renem<sup>h</sup> quoadmodum & uena, transuersim prorepens. Haec arteriae in renes integrā ab-  
sumuntur, uixq<sup>h</sup> uenarum modo ramulos notatu dignos in<sup>h</sup> pinguem renum tunicam disse-  
minant. Insuper ab arteria sinistru renem accedente, ac demissius plerunque, quā ea quae sini-  
stro reni offertur, principium sumentē, seminalis arteria nō enascitur, sed frequentissime (ut &  
dextri testis arteria) ab arteriae magnae corpore originem ducit. Aliquantulo enim humilius  
quā dextrae seminalis uenae<sup>h</sup> initium a caua exurgit, ab anteriori arteriae magnae sede semina-  
lium arteriarum<sup>h</sup> exortus pendet, quae ipso ortu inuicem sunt conterminae: ac dextra quidem

Praecipuae  
mesenterij ac-  
cedens arte-  
ria.

Renum arte-  
ria.

Seminales ar-  
teriae.

cauae uenae corpus<sup>h</sup> transcendens, dextrae seminali uenae attenditur, quouſq<sup>h</sup>  
ac ex magna peritonaei cauitate excidēs, ipsi uenae permisceatur, atq<sup>h</sup> cum illa  
efformet, quorum basis humilior<sup>h</sup> ue sedes superiori testis regioni implantatur.  
tiae & hanc proximē inuoluenti tunicae ramos praebet. Ad hunc quoque modum  
lis arteria sinistae congregitur uenae, & in mulieribus quoque<sup>h</sup> arteriarum ser-  
narum distributioni penitus congruit. Ut scilicet<sup>h</sup> media arteriarum pars in t-  
liaq<sup>h</sup> uasa constituat, altera autem fundum uteri implicet. Enarratis haec ten-  
alia succedit, inferius quā seminales arteriae, ab anteriori etiam magnae arte-  
ducens, & in humiliorem mesenterij sedem distributa. Quandoquidem ha-  
num, quā a liene ad rectum usq<sup>h</sup> intestinum prorepit, ac dein in ipsum quoque  
digeritur. A posteriori autem seu inferiori magnae arteriae sede, qua haec uerte-  
geniculatim<sup>h</sup> ramuli utrinq<sup>h</sup> ad singulas lumborum uertebras promuntur, &  
duam & musculos uertebris hūc adnatos excurrunt. Atque huiusmodi ra-  
amplitudinis ductusq<sup>h</sup> specie conueniunt, si modō<sup>h</sup> unicam utrobique propa-  
quum ceteris insignior multoq<sup>h</sup> crassior sit, ac iuxta sacri ossis summum pra-  
solum musculos uertebris attēfos accedit, uerū transuersim per peritonaei  
musculos ad latera usq<sup>h</sup> ab dominis exporrigitur. Haec uenae magna arteria in  
ne uenae cauae sinistro lateri succubuit, quum uerō sacri ossis principium arti-  
scendens, in<sup>h</sup> duos grandes truncos instat Y ad hunc modum X in uersis bipar-  
tus huius permutatio propter arteriae dignitatem. Quum enim haec dignior  
tur, non immeritō ipsam magis quā uenam recondi, occultari, & in alto co-  
mum iniurijs ferendis pertinacem effici, sagax rerū Opifex uoluit. Ne uerō  
sacri initio in dorsi motibus arteria promptē laxetur, superposita prius arter-  
riorē esse, illamq<sup>h</sup> hanc conscendere uoluit, ut uena instar sub sterniculi cuius  
deretur. Ceterum priusquam uenae cum arterijs in crus delabantur, quum i-  
superarūt, uenae arterijs superiores uehuntur: arteriaeq<sup>h</sup> quoniam digniores fun-  
duntur. Rami uerō qui a magnae arteriae supra sacri ossis initium diuisione pro-  
mis exactissime correspondent. Si exiguos fortē furculos secluseris, qui ab hu-  
de, quā haec primū bipartitō scinditur deorsum ducti, ac offe sacro suffulti  
subeunt, hac dorsalem medullā posterioremq<sup>h</sup> sacri ossis sedem petentes. At  
insignes occurrerūt, ut sectionū rudes has uenas esse arbitrent, quae in recti  
anum desinentes, feculentū sanguinem nonnunquā expurgarent. Sinister  
dum & dexter huius supra os sacrum factae diuisionis truncus, nō procul a diuisi-  
des partitū ramos, quorū<sup>h</sup> interior<sup>h</sup> exteriori gracilior est: ac illico duas a se  
nes, quāru<sup>h</sup> unam rursus interiorē<sup>h</sup> alterā uerō exteriorē doctrinae studio  
bis. Exterior simul cum<sup>h</sup> uena inter sacrum os & ilium os, quā haec inuicem deli-  
transuersim exporrigitur, & frequentē uicē sobole musculos ilium os am-  
adeo coxendicis articulū implicat. Anterior autē in uiris uescigē fundo, & cer-  
& paucas admodū etiam podici soboles dispensat. In mulieribus uerō, quib<sup>h</sup>  
grandior uisitur, in humiliorem fundi uteri regionem numerosa serie distribu-  
duntaxat insitū calorē resocillat, sed & foetus quoque, quando is utero geritur.  
go praeter uterū, etiā muliebri uescigē, & uteri ceruicē ramulis quibulda inter-  
rioris rami quibinas nunc explicatas eduxit propagines<sup>h</sup> reliquū est, deorsum  
arteriam, quae in umbilicū fertur, admittēs. Arteriae etenim ab umbilico secu-  
ca: latera deorsum ductae, ac in natis hominibus coriaceae inanesq<sup>h</sup> reddite, in-  
inferuntur, ipsi ue continuatur, quem modō ab interiori illo ramo reliquū el-  
dicebā. Is namq<sup>h</sup> nō minus quā uena ipsi attēsa pubis ossis<sup>h</sup> foramen peti-  
transit, propaginē assumit ab externo trunci ramo, ubi is iam in crus est pro-  
itaq<sup>h</sup> ramus ea propagine adactus, per pubis ossis foramen ducitur, & in mu-  
occupantes, & illos qui a pubis offe principii sumunt dispergitur, perinde ac  
foramen transiens. Ac quemadmodū haec iuxta mediū longitudinis femoris  
ipſius furculo alteri uenae in<sup>h</sup> quintū femur mouentiū musculum dispensatae  
nē & praesens arteriae ramus suo fine cum alia<sup>h</sup> coit<sup>h</sup> arteria, quam illi musculo  
tente arteria distribui non ita multo post subijciam. Exterior namq<sup>h</sup> ramus sin-  
uisionis, quam supra os sacrum fieri dicebā, per inguinā in leuum crus<sup>h</sup> descen-  
uerō peritonaeum permeat, propaginem sursum peritonaeo exporrigit, qu-  
minis sui lateris musculum accedens, furculos in conterminas sedes transuer-